



10. إعطاء محلول الإمهامة الفموية

التحديث الأخير: 14-09-2022

لمحة عامة

- محلول الإمهامة الفموية هو الخطوة الأولى في علاج الأشخاص الذين يعانون من الإسهال والجفاف.
- إذا لم تكن تظهر على المريض أي علامات دالة على إصابته بالجفاف أو ظهرت عليه علامات الإصابة بجفاف طفيف (أنظر الى أداة العمل السابعة)، فيمكن علاجه في المنزل.

في حال عدم ظهور علامات الإصابة بالجفاف

- اشرح كيفية تحضير محلول الإمهامة الفموية وإعطائه.
- يجب على مقدم الرعاية إعطاء كمية من محلول الإمهامة الفموية وفقاً لما يرد في الجدول أدناه.

العمر	كمية محلول الإمهامة الفموية اللازمة بعد كل عملية تبرز	عدد عبوات محلول الإمهامة الفموية اللازمة
أقل من 24 شهراً	50 – 100 مل (1/4 – 1/2 كوب)	1 عبوة/يوم
سنتان – 9 سنوات	100 – 200 مل (1/2 – 1 كوب)	1 عبوة/يوم
10 سنوات أو أكثر	بقدر ما يريد المريض	1 عبوة/يوم

في حال ظهور بعض علامات الإصابة بالجفاف

- إعطاء القدر الموصى به من محلول الإمهامة الفموية (مقاس في ضوء عمر المريض أو وزنه).
- إذا كان المريض يخرج برازاً مائياً أو يريد من محلول الإمهامة الفموية ما يزيد على ما هو مبين في الجدول أدناه، فأعطه المزيد.
- إذا لم يطرأ تحسن على المريض أو إذا ظهرت عليه بعض علامات الجفاف الحاد، فيتعين إحالة المريض إلى مرفق صحي (أنظر الى أداة العمل الرابعة).


العمر	أقل من 4 أشهر	4 أشهر – 11 شهراً	12 شهراً – 23 شهراً	سنتان – 4 سنوات	5 سنوات – 14 سنة	15 سنة أو أكثر
الوزن	أقل من 5 كغم	5-7.9 كغم	8-10.9 كغم	11-15.9 كغم	16-22.9 كغم	30 كغم أو أكثر

العمر	أقل من 4 أشهر	4 أشهر - 11 شهراً	12 شهراً - 23 شهراً	سنتان - 4 سنوات	5 سنوات - 14 سنة	15 سنة أو أكثر
محلول عن طريق الفم بالملييلتر	200-400 (كوب - كوبان)	400-600 (كوبان - 3 أكواب)	600-800 (3-4 أكواب)	800-1200 (4-6 أكواب)	1200-2200 (6 أكواب - 11 كوباً)	2200-4000 (11-20 كوباً)

كيفية إعطاء محلول الإمهاء الفموية

من المهم تعليم الأمهات ومقدمي الرعاية إدارة محلول الإمهاء الفموية للأطفال بشكل صحيح من أجل مساعدة الطفل على التحسن ومنع انتشار الوباء.

1. للطفل الذي يقل عمره عن سنتين، أعطه ملعقة صغيرة واحدة كل دقيقة - دقيقتين.
2. لطفل أكبر سناً، أعطه رشقات متكررة من كوب.
3. إذا تقيأ الطفل، انتظر 10 دقائق ثم أعطه المحلول مرة أخرى، ولكن بمزيد من البطء.
4. إذا استمر الإسهال بعد استخدام عبوة من أملاح الإمهاء الفموية، فأعطه علاجات منزلية حتى تحصل على المزيد من عبوات أملاح الإمهاء الفموية.
5. إعطاء الطفل الكثير من الماء على قدر ما يمكنه شربه.
6. استمر في تقييم حالة الجفاف، وأحل الطفل إلى عيادة صحية إذا ساءت حالته أو لم تتحسن بعد بضع ساعات.



إعطاء محلول الإمهاء الفموية لطفل ولشخص بالغ

رسائل المجتمع



01. اعداد محلول الإمهاة الفموية وإعطؤه